

Pollinatörer på skyddszoner och kantzoner

SVEA-konferensen 2013

Petter Haldén HS Konsult

Klöverhumla Brunnby, juli 2010.



Hushållnings
sällskapet



©Petter Haldén

- 
- Insektspollinering avgörande för skörd i klöverfröodling
 - Betydelsefull i åkerbönor och våraps (5-15%)
 - Vilda pollinatörer (humlor) minskar
 - Biodlingsföretagandet minskar

Skapa blomrika områden på fältkanter och skyddszoner för att gynna pollinatörer under svältperioder

Försök med ettåriga kantzoner 2011-2012 (finansierat Jordbruksverket)

- 20-tal platser i Mälardalen, Västergötland, och Skåne
- 300 m² kantzon/plats
- Honungsört, perserklöver, fodervicker och lupin
- Honungsbin, humlor, blomflugor och fjärilar räknade
- Blomningsintensitet uppskattad
- Jämförelser med blomfattiga kantzoner ex. stråsäd
- Påverkan på skörd ej beräknad

Resultat

- Honungsört och perserklöver mycket attraktiva för humlor och bin, som mest 3 humlor/m²
- Honungsört blommar intensivt 7 veckor efter sådd
- Perserklöver blommar intensivt ca 10 veckor efter sådd.
- Perserklöver mer utdragen blomning än honungsört
- Undvik lupin och fodervicker



Råd

- Så honungsört och perserklöver tillsammans för lång blomning
- 5 kg/ha vardera räcker
- Kostnad 50-100 kr/kg
- Så i samband med vårbruket - torkkänsliga
- Putsa inför skörd av klöverfrö

Blommande kantzoner - Y x

← → ↺

www.youtube.com/watch?v=DUOcyGP1vk

You Tube SE

kantzoner

Ladda upp

GUIDE

FLER RESULTAT kantzoner NY

... Tappa aldrig bort dig

Bläddra bland videoklipp från föregående sida, inklusive flödet på startsidan, videoklipp i kanaler och sökresultat.

Uppfattat!



0:05 / 5:01

Blommande kantzoner

 Jordbruksverket - 58 videoklipp

321 visningar

 Gilla



Om

Dela

Lägg till i





Publicerad den 14 nov 2012

Lär dig hur du anlägger blommande kantzoner. Blommor hjälper pollinatörer som humlor, bin och fjärilar. Det ger en rikare biologisk mångfald i odlingslandskapet och kan ge större skördar.



Många har skyddszoner (3000 kr/ha), skapa blomrika områden!

Utökat åtagande ok

Plöj inte (sanktion!) Bränn förna först!?

Hjälpså insektsgynnande örtblandningar (max 10 % baljväxter)

Skörd gynnar varierad flora och minskar oönskade ogräs



Örtrik skyddszon sådd 1988 och skördad i 22 år.
Åkervädd, rödklint, gulmåra, blåklocka bl.a.



åkervädd

Om putsning -spara oslagen remsa





Humledrottningar laddar tidig vår med proteinrikt pollen från hansälgar



hansälg

Brunnby Lantbrukardag 8 juli 2011
Demonstrationsodling med lämpliga pollinatörsväxter för marginalmarker
som fälthörn och skyddszoner

Välkomna 4 juli 2013!

